



INSTITUTO ABARE ETE

Estado do Amazonas
Prefeitura de Boca do Acre
Concurso Público - Edital 002/2015

Caderno de Prova



Data → 31/10/2015



Período → Tarde



Questões → 50 questões

MEDICO PEDIATRA

Instruções:

- Para fazer a prova você usará:
 - Este caderno de prova
 - Um cartão – resposta que contém seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura;
- Verifique se seus dados estão corretos no cartão – resposta;
- Verifique se não há divergências quanto ao número de questões no caderno de prova.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção:

- Cada questão deste caderno possui somente uma alternativa válida (A, B, C, D ou E).
- Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTA.
- Preencha a FOLHA DE RESPOSTA com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, cobrindo totalmente o espaço da alternativa assinalada.
- Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado para as respostas ou assinatura.

PORTUGUÊS

1. “A linguagem é uma atividade humana e é sempre utilizada em situações de interlocução. Pressupõe, portanto, a existência de interlocutores. Por meio da linguagem elaboramos representações a cerca do mundo em que vivemos, organizamos e damos formas as nossas experiências. Nas representações que constrói, a linguagem traz marca de aspectos históricos, sociais e ideológicos de uma determinada cultura.”

Maria Luiza M. Abaurre.

A partir do que afirmou Maria Abaurre a respeito de linguagem podemos afirmar que:

- A pintura, a música, a dança e os sistemas gestuais são exemplos de diferentes linguagens.
- A linguagem é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas.
- A sofisticada comunicação entre os animais pode ser incluída como um exemplo de linguagem
- Um texto não verbal, por ser figurativo, não pode ser classificado como linguagem.
- A inexistência de interlocutores não interfere na linguagem.

2. “A língua é um sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam, permitindo que expressemos uma ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo, enfim, um enunciado de sentido completo que estabelece comunicação.”

José de Nicola

Baseando-se no conceito de língua conclui-se que:

- a língua é a linguagem verbal e não verbal
- língua é o código verbal de uma determinada comunidade
- a língua é desprovida de regras e é imutável
- língua é o uso do código não verbal
- língua e linguagem é a mesma coisa

3. Em uma determinada escola, a lixeira da sala dos professores se localizava entre o bebedouro e a mesa em que era servido o lanche. Visando a higiene e preocupada com a contaminação da água e dos alimentos, uma funcionária deslocou a lixeira para longe destes e redigiu o seguinte texto informativo que foi afixado na parede:

“Por favor, não misture LIXO com alimentos e água.

Deixe a lixeira neste local.

Agradecemos à compreensão.”

Sabendo que a linguagem é qualquer processo de comunicação, podemos afirmar que:

- Da forma como essa mensagem foi escrita, a comunidade escolar pode entender que o objetivo da mensagem é: “não jogue alimentos e água juntamente com o lixo”;
 - A palavra “não misture” contribui para na interpretação errônea do interlocutor
 - O texto deixa claro que a lixeira não deve ficar próxima do bebedouro e da mesa de alimentos para não gerar contaminação
- Apenas I e III estão corretas;
 - I, II e III estão corretas
 - Apenas II e III estão corretas
 - Apenas I e II estão corretas;
 - Nenhuma afirmativa está correta

4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à memorização de regras gramaticais aplicadas a uma única modalidade, a língua escrita, em uma única variante, a padrão-culta. A língua é tratada como uma dobra sobre si mesma no sentido de que o estudo da estrutura e da forma é visto como suficiente e até mesmo essencial para que, como consequência natural e necessária, o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais, aqueles inseridos em situações cotidianas de comunicação, quer escolares, quer não. Obviamente, e a experiência é testemunha disto, essa consequência não é assim tão natural e, menos ainda, necessária. Muito pelo contrário, a “aprendizagem” da metalinguagem parece até distanciar o

aprendiz das tarefas de compreensão leitora e de produção de textos/discursos. O estudo da gramática normativa acaba por inibir e limitar a atividade de produção do aluno, pois este tem sempre a impressão de não saber escrever, como se a língua escrita fosse uma modalidade a que somente os grandes literatos têm acesso, longe, portanto, do uso corrente advindo de necessidades cotidianas. Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais diversos meios e nas mais diferentes profissões – inclusive na de professor –, profissionais afirmando categoricamente não saber “colocar suas ideias no papel” e ter dificuldade para ler um texto mais especializado e mais complexo.[...]

Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania Morales Rowell

A respeito do texto é correto afirmar que:

- a) a compreensão das regras gramaticais é essencial para que o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente textos/discursos reais;
- b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever, produzir textos não tem a ver com o estudo enfático e praticamente exclusivo da gramática normativa;
- c) o ensino da língua portuguesa tem se limitado à língua escrita e a variedade padrão;
- d) a aprendizagem da metalinguagem contribui na tarefa de compreensão leitora e na produção de textos;
- e) “não saber “colocar suas ideias no papel”” tem a ver com o pouco conhecimento da variedade padrão-culta

5. Leia o texto a seguir:

São Paulo, 04 de setembro de 2011.

Caro Sr. Editor do Jornal *Folha de São Paulo*,

Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais

Compreende-se que alunos mineiros serão prejudicados pela greve de professores.

Contudo não seria correto suspender o exame, já que o total de inscritos na prova chega a quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que os outros milhões de jovens se preparam o ano todo.

O fato de os mineiros não estarem em situação de igualdade com os outros é, sem dúvida, um

infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os problemas na educação não atingem um único Estado.

Cordialmente,

F.H.S.

O texto acima possui local e data, vocativo, assunto, introdução desenvolvimento e conclusão das ideias, saudação e assinatura. Baseando-se nessas informações podemos afirmar que este texto pertence ao gênero:

- a) Notícia
- b) Artigo de opinião
- c) Carta do leitor
- d) Editorial
- e) Carta de reclamação e de solicitação

6. Levando em consideração a variedade linguística é correto afirmar que:

Causo de mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um kidicarnecumastumate pra fazer uma macarronada cum galinhassada. Quascaídesustoquanduvi um baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A receita mandopômidipocadenda galinha prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco quineim um lidileite. Foi um trem doidimais! Quascaídendapia! Fiquei sem sabêdondecovim, proncovô, oncontô. Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém semaxucô!

(<http://bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/mensagens/engraçadas>)

- a) Na maior parte das palavras ocorreu aglutinação o que não compromete a compreensão do texto
- b) O uso do dialeto caipira se enquadra na linguagem padrão formal
- c) De acordo com a sociolinguística, a variedade linguística do texto referido é considerada incorreta
- d) O texto usa gíria como variedade linguística

e) O texto enfatiza a variedade não padrão através do dialeto mineiro que foi intencionalmente exagerado.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa incorreta:



- a) a mudança de tempo está ligada com a variedade linguística
- b) a tira não aborda a variedade linguística
- c) a variação histórica é um tipo de variedade linguística
- d) a linguagem sofreu mudanças
- e) a variedade histórica não interfere na comunicação

8. Observe os textos abaixo:



I.

II.

O que é poesia?

Que é poesia?

Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.

(Cassiano Ramos)

III.



- a) I e III são metalinguísticos
- b) I, II e III são intertextuais
- c) I e II são metalinguísticos
- d) Apenas II é metalinguística
- e) I, II e III são metalinguísticos

9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o que não quer ver se aplica com perfeição na análise sobre o atual estágio da mídia: desconhecer ou tentar ignorar os incríveis avanços tecnológicos de nossos dias, e supor que eles não terão reflexos profundos no futuro dos jornais é simplesmente impossível.

SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de dez. 1995.

A respeito da intertextualidade do texto é correto afirmar que:

- a) foi feita com um romance
- b) foi feita com um poema
- c) foi feita com um filme
- d) foi feita com um provérbio
- e) não há intertextualidade

Leia os textos abaixo para responder as questões 10:

Texto I

Autopsicográfica

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente.

E os que lêem o que escreve,

Na dor lida sentem bem,

Não as duas que ele teve,

Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.

Fernando Pessoa

Texto II

Por que escrevo?

O escritor é um observador.

Observa tão atentamente

Que na escrita tem que expor

Tudo o que percebe à frente.

E ainda sabe ele que ao escrever

De fugir da timidez é capaz...

Se cara a cara não consegue deixar ver

Tudo o que seu coração traz...

E, enfim, nos textos que cria

(Com gosto doce, salgado ou azedo)

Está a sua mais profunda fantasia,

Toda sua emoção, todo seu medo.

Brincar com as letras é, com magia,

Levar seu mundo à ponta do dedo.

Ana Helena Ribeiro Tavares

10. A respeito do texto II, podemos afirmar que em relação ao texto I é:

- a) uma síntese.
- b) uma retextualização.
- c) uma resenha.
- d) um paráfrase.
- e) uma intertextualidade.

PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS

11. Escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade” define:

- a) Acessibilidade.
- b) Acolhimento.
- c) Recepção.
- d) Adstrição.
- e) Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal (Art. 9º lei 8080/90). Avalie se a direção do SUS é exercida pelos seguintes órgãos:

- I - No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social.
- II - No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Está correto o que se afirma em:

- a. I, apenas.
- b. II, apenas.
- c. I e III, apenas.
- d. II e III, apenas.
- e. I, II e III.

12. Aos casos de improbidade administrativa e de insubordinação grave em serviço aplicam-se respectivamente as seguintes penalidades:

- a. Advertência e suspensão.
- b. Suspensão e suspensão.
- c. Demissão e suspensão.
- d. Demissão e demissão
- e. Suspensão e advertência.

13. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite CIT. Considerando o disposto no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde para ser instituída deve conter, dentre outras, ações e serviços de.....

- I. Atenção terciária.
- II. Urgência e emergência.

III. Atenção psicossocial.

IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) Apenas II, III.
- e) Nenhuma das opções.

14. De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo.

_____ – serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

_____ – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

_____ – conjunto de ações e serviços e saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima.

- a) Portas de Entrada – Comissões intergestores – Rede de atenção à saúde.
- b) Portas de Entrada – Mapa da saúde – Rede de atenção à saúde
- c) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Portas de entrada
- d) Rede de Atenção à saúde – Comissões intergestores – Mapa da saúde
- e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da saúde – Serviços Especiais de Acesso Aberto.

15. A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso _____ às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

- a) Universal
- b) Igualitário
- c) Universal e Igualitário
- d) Discriminatório

e) Voluntario

16. A partir da Emenda Constitucional Nº 51, de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores _____ do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

- a) Federais
- b) Estaduais
- c) Municipais
- d) Regionais
- e) Locais

17. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais _____ na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

- a) Nacionais .
- b) Estrangeiros.
- c) Público.
- d) Privado.
- e) Todas estão erradas.

18. Constituem princípios básicos e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecidos pela Constituição de 1988:

- a) centralização e participação da comunidade;
- b) rede regionalizada e atendimento individual;
- c) atendimento integral e descentralização;
- d) atendimento humanizado e cooperativo;
- e) participação da comunidade e atendimento especializado.

19. Sobre as Ações da Redução de Danos (PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE 2005) é INCORRETO afirmar que...

- a) Estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo à adoção de

comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, e nas práticas sexuais de seus consumidores e parceiros sexuais.

- b) Em todas as ações de redução de danos, a identidade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente se faz apenas aquele que ainda responde por si.
- c) Define-se que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se reportem os seus usuários.
- d) A contratação de pessoal para o trabalho com redução de danos, de que trata esta Portaria, deve dar prioridade aos membros da comunidade onde as ações serão desenvolvidas, observadas, no âmbito da Administração Pública, as normas de acesso a cargos ou empregos públicos, levando-se em conta principalmente o acesso à população alvo, independentemente do nível de instrução formal.
- e) As ações de informação, educação e aconselhamento devem, necessariamente, ser acompanhadas da distribuição dos insumos destinados a minimizar os riscos decorrentes do consumo de produtos, substâncias e drogas que causem dependência.

20. As diretrizes do Sistema Único de Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de 1988, inclui-se:

- a) participação da comunidade
- b) prioridade para o atendimento hospitalar;
- c) centralização das ações de saúde no governo federal;
- d) financiamento privado da saúde;
- e) regulação do setor de saúde suplementar.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Samir tem 14 anos e procura atendimento médico preocupado com seu desenvolvimento

genital. Notou que a maior parte de seus amigos possui pênis de tamanho maior que o seu, além de pilificação na região pubiana. Ao exame físico, adolescente apresenta pênis infantil, volume testicular 4 ml; discreta pelagem na base do pênis. Peso e estatura no percentil 15 para idade e sexo. Qual a hipótese diagnóstica neste momento?

- a) Hipogonadismo hipergonadótico.
- b) Hipogonadismo hipergonadotrófico.
- c) Atraso constitucional do crescimento e da puberdade.
- d) Puberdade fisiológica.
- e) Síndrome de Klinefelter.

22. Lactente de 8 meses, oriundo de pequena cidade com poucos recursos, é transferido para hospital terciário por quadro de pneumonia grave. Na história pregressa, consta apenas alta tardia da maternidade, por atraso na eliminação de mecônio, e três outros episódios de pneumonia (radiografias anteriores mostram acometimento em diferentes topografias pulmonares). Irmão mais velho desta criança havia falecido ainda na infância, por quadro de desnutrição e infecções pulmonares recorrentes. Durante a anamnese, mãe informa que o teste do pezinho deste lactente tinha apresentado uma alteração, mas que não havia sido possível repetir o exame. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, qual exame será solicitado, neste momento, com o intuito de confirmá-la?

- a) Biópsia retal.
- b) Teste do suor.
- c) Dosagem de imunoglobulinas séricas.
- d) Tomografia computadorizada de tórax.
- e) Broncoscopia.

23. Lactente de 19 meses é atendido na UPA com história de rinorreia e febre há 3 dias. No momento do atendimento, estava com temperatura de 39,5°C, já tendo sido medicado com paracetamol poucos minutos antes. Apresentava-se em bom estado geral, com abaulamento da membrana timpânica à direita. O pediatra testemunhou o aparecimento de movimentos tonicoclônicos generalizados, que desapareceram espontaneamente em dois

minutos. Familiares negam que a criança tenha tido quadro semelhante prévio. Foi iniciado o tratamento para a otite média e 24 horas depois, a crise não tinha se repetido. A principal hipótese, com base nos dados, é:

- a) Meningoencefalite viral.
- b) Crise febril complexa.
- c) Crise febril simples.
- d) Epilepsia.
- e) Meningite bacteriana.

24. No 2o dia após o parto, uma nutriz apresenta o surgimento de lesões vesiculares agrupadas, na comissura labial esquerda. Diante do fato, qual a conduta recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria?

- a) Recomendar que o leite materno seja ordenhado e oferecido por copinho.
- b) Suspender temporariamente a amamentação e oferecer fórmula infantil.
- c) Manter a amamentação diretamente na mama, cobrindo as lesões e lavando as mãos.
- d) Manter a amamentação e prescrever imunoglobulina para o recém-nascido.
- e) Recomendar que leite materno seja ordenhado, pasteurizado e oferecido por copinho.

25. Um recém-nascido a termo, com peso ao nascer de 3.315 g, com boas condições de vitalidade ao nascer, inicia a amamentação ainda na sala de parto. No quinto dia de vida, apresenta icterícia, hepatomegalia, dificuldade para sucção, prostração. Solicitada internação, identifica-se hipoglicemia e sepse por *Escherichia coli*. A principal hipótese do plantonista foi confirmada e foi iniciada alimentação com fórmula a base de soja, levando à melhora clínica da criança. Qual deverá ter sido esta hipótese?

- a) Galactosemia.
- b) Alergia à proteína do leite de vaca.
- c) Deficiência congênita de lactase.
- d) Fenilcetonúria.
- e) Intolerância secundária à lactose.

26. Carlos Marcos é um escolar de 9 anos, atendido pela primeira vez em seu ambulatório. Traz a sua Caderneta da Saúde da Criança, onde você nota que todos os dados antropométricos estão corretamente preenchidos, desde o nascimento. Nos primeiros 18 meses de vida, a criança tinha uma curva de crescimento estatural entre os percentis 15 e 50. Porém, dos 18 as 24 meses, teve uma desaceleração nesta curva e desde então cresce abaixo do percentil 3. Atualmente tem 120,8 cm (abaixo do p3). Seu pai tem 1,62m e sua mãe tem 1,49m. Considerando o caso, assinale a afirmativa correta.

- a) O alvo-genético deste paciente é de 1,62m.
- b) Caso a idade óssea esteja atrasada, a principal hipótese será de baixa estatura familiar.
- c) A desaceleração ocorrida no final do segundo ano indica doença endócrina subjacente.
- d) A avaliação do estadiamento puberal não terá importância para a avaliação do caso.
- e) A presença de baixa estatura desproporcional irá apontar para uma variante normal do crescimento.

27. Maíra é uma lactente de 10 meses com peso entre os escore-Z -2 e 2. Foi mantida em aleitamento materno exclusivo até os 2 meses. Desde então, começou a receber leite de vaca e a introdução da alimentação complementar aconteceu aos 5 meses. Atualmente, recebe 5 mamadeiras de leite por dia, uma papa de frutas e uma refeição salgada (com macarrão e legumes). Mãe vem notando que a criança está mais pálida. Ao exame, bom estado geral, palidez cutaneomucosa, ausência de adenomegalias ou visceromegalias. Solicitado hemograma, com os seguintes resultados: hemoglobina 8,0 g/dl, VCM 69fl, RDW 22%. Qual a melhor conduta neste momento?

- a) Orientar ingestão de alimentos ricos em ferro e realizar novo exame em 2 meses.
- b) Iniciar ferro profilático, orientar ingestão de alimentos ricos em ferro e realizar novos exames em 2 meses.
- c) Solicitar eletroforese de hemoglobina.
- d) Iniciar tratamento com sulfato ferroso em dose terapêutica.

e) Solicitar internação hospitalar para hemotransfusão e investigação.

28. O primeiro resultado de carga viral de um lactente de 6 semanas em acompanhamento por exposição perinatal ao HIV indica 20.000 cópias/ml. Um novo exame é feito, e os valores se confirmam. Indique a conduta neste momento.

- a) Solicitar genotipagem e só iniciar o tratamento após o resultado da mesma.
- b) Iniciar o tratamento apenas se carga viral for maior que 100.000 cópias/ml.
- c) Iniciar o tratamento apenas se contagem de LT-CD4+ for menor que 15%.
- d) Iniciar o tratamento apenas se contagem de LT-CD4+ for menor que 15% e a carga viral for maior que 100.000 cópias/ml.
- e) Solicitar a genotipagem e iniciar a terapia antirretroviral.

29. No ano de 2015, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a idade de recomendação da vacina contra o HPV para mulheres vivendo com HIV. Qual afirmativa traz a recomendação correta de acordo com o MS?

- a) As mulheres de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a vacina com intervalo de doses de 0, 2 e 6 meses.
- b) As mulheres de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a vacina com intervalo de doses de 0, 6 e 60 meses.
- c) As mulheres de 9 a 35 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a vacina com intervalo de doses de 0, 2 e 6 meses.
- d) As mulheres de 9 a 35 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a vacina com intervalo de doses de 0, 6 e 60 meses.
- e) As mulheres de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a vacina com intervalo de doses de 0, 2, 6 e 60 meses.

30. Durante uma reunião realizada em uma Unidade de Estratégia de Saúde da Família, são discutidas formas de se estimular o desenvolvimento de uma criança ao longo do primeiro ano de vida. Uma usuária mostra-se preocupada com o desenvolvimento de seu

filho de 3 meses. Considerando-se o desenvolvimento normal, a ausência de qual das habilidades abaixo seria preocupante nesta idade?

- a) Sentar-se com apoio.
- b) Leva objetos à boca.
- c) Rolar quando apoiada no chão.
- d) Sorriso social quando estimulada.
- e) Imitar gestos.

31. Recém-nascido, no 14o dia de vida, é levado para atendimento de urgência pois está apresentando vômitos e pouca aceitação da dieta. Nascido a termo, parto vaginal, com peso ao nascer de 3.800 g. Ao exame físico, peso de 3.250 g, desidratado; o exame da genitália revela falo de 1,5 cm de comprimento com gônadas não palpáveis. Considerando-se a principal hipótese diagnóstica, o que deve ser esperado na avaliação complementar desta criança?

- a) Hipoglicemia, hiponatremia e hipocalemia.
- b) Hipoglicemia, hiponatremia e hipercalemia.
- c) Hipoglicemia, hipernatremia e hipocalemia.
- d) Hiperglicemia, hipernatremia e hipercalemia.
- e) Hiperglicemia, hiponatremia e hipercalemia.

32. Um lactente de 18 meses é atendido com quadro compatível com resfriado comum há cerca de 5 dias. Há 48 horas, mãe vem notando que a criança encontra-se mais chorosa que o habitual e vem tendo febre (de até 38,5°C). Ao exame, secreção nasal abundante, oroscopia sem alterações. Otoscopia: membrana timpânica bastante hiperemiada e abaulada à esquerda e à direita. Mãe nega quadro semelhante prévio e nega uso prévio de antimicrobianos. De acordo com as atuais recomendações da Academia Americana de Pediatria (2013), qual a conduta indicada neste momento?

- a) Prescrever apenas analgésico e marcar reavaliação em 48 horas.
- b) Prescrever amoxicilina-clavulanato e analgésicos.
- c) Prescrever amoxicilina e analgésicos.
- d) Prescrever gotas otológicas com

anestésicos e antimicrobianos.

- e) Prescrever gotas otológicas com anestésicos, antimicrobianos e corticoides.

33. Recém-nascida é avaliada por cianose e recebe o diagnóstico de anomalia de Ebstein. Esta cardiopatia é caracterizada por:

- a) Drenagem das quatro veias pulmonares anormalmente no átrio direito ou em uma das veias sistêmicas.
- b) Associação de dextroposição da aorta, hipertrofia do ventrículo direito, obstrução do trato de saída do ventrículo direito e comunicação interventricular.
- c) Alteração na valva tricúspide, com deslocamento intraventricular dos folhetos septal e posterior.
- d) Relação anormal entre as grandes artérias e os ventrículos (aorta origina-se do ventrículo direito, e a artéria pulmonar, do ventrículo esquerdo).
- e) Presença de apenas um vaso arterial emergindo da base do coração e dando origem às circulações sistêmica, pulmonar e coronariana.

34. Lactente de 4 meses é levado ao posto de saúde e recebe as vacinas apropriadas para a sua idade. Doze horas depois, apresenta crise convulsiva tonicoclônica generalizada, com duração de poucos minutos, sem recorrência e sem outras alterações. Qual das opções indica a melhor recomendação para vacinação aos 6 meses?

- a) Recomendar pentavalente, vacina oral de rotavírus humano, vacina oral contra poliomielite e vacina pneumocócica conjugada.
- b) Recomendar pentavalente, vacina oral contra poliomielite e vacina pneumocócica conjugada.
- c) Recomendar DTPa, vacina contra hepatite B, vacina contra Haemophilus influenzae tipo B, vacina oral de rotavírus humano, vacina oral contra poliomielite e vacina pneumocócica conjugada.
- d) Recomendar DT, vacina contra hepatite B, vacina contra Haemophilus influenzae tipo B, vacina oral de rotavírus humano, vacina oral

contra poliomielite e vacina pneumocócica conjugada.

- e) Recomendar DTPa, vacina contra hepatite B, vacina contra Haemophilus influenzae tipo B, vacina oral contra poliomielite e vacina pneumocócica conjugada.

35. Você é responsável pela primeira prescrição de um recém-nascido a termo, filho de gestante diabética, grande para a idade gestacional. Qual sua conduta em relação à hipoglicemia?

- a) Realizar avaliação da glicemia apenas se houver manifestações clínicas. Estimular o aleitamento materno, mas recomendar o oferecimento regular de fórmula infantil após cada mamada.
- b) Realizar avaliação da glicemia independente da presença de manifestações clínicas. Estimular o aleitamento materno exclusivo.
- c) Realizar avaliação da glicemia independente da presença de manifestações clínicas. Estimular o aleitamento materno, mas recomendar o oferecimento regular de fórmula infantil após cada mamada.
- d) Realizar avaliação da glicemia apenas se houver manifestações clínicas. Estimular o aleitamento materno exclusivo.
- e) Realizar avaliação da glicemia independente da presença de manifestações clínicas. Estimular o aleitamento materno, mas recomendar o oferecimento regular de solução de glicose por via oral após cada mamada.

36. Sammy é um escolar de sete anos em acompanhamento regular no ambulatório de pediatria. Ao exame físico, identifica-se: índice de massa corporal de 20 kg/m² (entre EZ 2 e 3, pelo gráfico da OMS), estatura de 122 cm (percentil 50, pelo gráfico do CDC/NCHS) e pressão arterial de 116 x 72 mmHg. Em outras duas ocasiões, a pressão aferida foi de 118 x 70 mmHg e de 120 x 72. Após avaliar a tabela abaixo (com a distribuição em percentis da pressão arterial segundo percentis de estatura e idade para o sexo masculino), indique a opção correta.

- a) Sammy tem sobrepeso e hipertensão arterial.
- b) Sammy tem sobrepeso e pré-hipertensão.
- c) Sammy tem obesidade e pressão arterial normal.
- d) Sammy tem obesidade e pré-hipertensão.
- e) Sammy tem obesidade e hipertensão arterial.

37. Recém-nascido, a termo, parto vaginal, está no alojamento conjunto. No final da tarde, quando a criança tem 10 horas de vida, você é chamado para avaliar a presença de edema palpebral e hiperemia conjuntival bilaterais. Sem saber o que causou o quadro, você decide passar a noite estudando mas, na manhã seguinte, o quadro já se resolveu. Qual a causa mais provável da alteração observada?

- a) Conjuntivite química.
- b) Conjuntivite gonocócica.
- c) Conjuntivite por clamídia.
- d) Conjuntivite viral.
- e) Conjuntivite bacteriana inespecífica.

38. Em relação ao transporte seguro de crianças, qual das opções abaixo está de acordo com as atuais recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria?

- a) Os recém-nascidos, logo após a alta na maternidade, não podem usar assentos de segurança, devendo ser transportados no colo de responsáveis, no banco traseiro do veículo.
- b) Um lactente de nove meses deve ser transportado em assento específico, no banco traseiro do veículo, voltado para a frente (painel) do veículo.
- c) Um lactente de quatro meses deve ser transportado em assento específico, no banco traseiro do veículo, voltado para a traseira do veículo.
- d) As crianças com altura superior a 1 metro podem ser transportadas apenas com o cinto de três pontos do veículo, sempre no banco traseiro.
- e) Crianças maiores de 10 anos já podem ser transportadas no banco dianteiro, sempre com o cinto de três pontos do veículo.

39. De acordo com os critérios da International Diabetes Federation, qual dos parâmetros abaixo NÃO é utilizado na caracterização da síndrome metabólica em adolescentes de 10 a 16 anos?

- a) Circunferência abdominal maior ou igual ao percentil 75.
- b) Níveis de triglicérides maiores ou iguais a 150 mg/dl.
- c) Nível de HDL-colesterol inferior a 40 mg/dl.
- d) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 85 mmHg.
- e) Glicemia de jejum maior ou igual a 100 mg/dl ou diagnóstico de DM tipo 2.

40. Lactente de 13 meses é avaliado por quadro de diarreia crônica. A avaliação dos dados antropométricos indica que o lactente tem peso que corresponde a 78% do peso considerado ideal para a sua idade. Sem alterações observadas ao exame físico. Qual a classificação nutricional, segundo Gómez?

- a) Eutrofia.
- b) Desnutrição leve.
- c) Desnutrição moderada.
- d) Desnutrição grave.
- e) Desnutrição crônica.

41. A febre é um fenômeno em que ocorre elevação do ponto de termorregulação do centro termorregulador desencadeando um conjunto de mecanismos que visam elevar a temperatura corporal. Já na hipertermia, a elevação da temperatura corporal ocorre por dificuldade em se perder calor de forma eficiente. No manejo da febre e da hipertermia em crianças, podemos afirmar que:

- a) A utilização de métodos físicos (banhos mornos, compressas frias) tem indicação precisa nos casos de febre.
- b) Não existe indicação para se usar a combinação de dois antitérmicos intercalados, para um melhor efeito terapêutico.
- c) O ácido acetilsalicílico tem boa ação central

e periférica, sendo indicado nos casos de dengue em seus estágios iniciais.

- d) A dipirona tem potente efeito analgésico e pouco efeito anti-inflamatório e tem ação tanto central como periférica, dependendo da dose.
- e) A magnitude da temperatura alcançada nos quadros febris tem tanto valor prognóstico (gravidade) como diagnóstico (etiologia viral ou bacteriana) nos quadros infecciosos.

42. A recomendação atual do Programa Nacional de Imunizações para a imunização contra a poliomielite é que sejam aplicadas aos 2, 4 e 6 meses respectivamente as vacinas:

- a) atenuada – atenuada – inativada.
- b) atenuada – inativada – inativada.
- c) inativada – atenuada – atenuada.
- d) inativada – atenuada – inativada.
- e) inativada – inativada – atenuada.

43. Lactente de 9 meses apresenta-se no pronto atendimento em estado de mal epilético (mais de 30 minutos de duração). A despeito do tratamento instituído, persiste a atividade convulsiva e instala-se o estado de mal epilético refratário. A droga de escolha a se utilizar neste momento ao paciente é:

- a) Tiopental.
- b) Lidocaína.
- c) Midazolam.
- d) Fenobarbital.
- e) Sulfato de magnésio.

44. Escolar de 7 anos, masculino, há uma semana com manchas no corpo, claudicação e dor em joelhos, dor abdominal periumbilical, náuseas e vômitos. Ao exame observa-se púrpura palpável principalmente em membros inferiores simétricas e em nádegas, aumento de volume em joelhos. A alteração laboratorial que mais provavelmente encontraríamos neste paciente é:

- a) Plaquetopenia.
- b) Hemocultura positiva.
- c) Hematúria microscópica.
- d) Blastos em sangue periférico.

e) Aumento da velocidade de hemossedimentação.

45. Você está examinando um recém-nascido em programação de alta hospitalar no alojamento conjunto e, ao realizar triagem neonatal com oximetria de pulso (“teste do coraçõzinho”), observa que a saturação no membro superior direito é de 98% e a do membro inferior é 94% em duas medições com intervalo de uma hora entre elas. Qual o significado desse achado e a conduta adequada a seguir?

- a) Presença de hipertensão pulmonar, solicitar ecocardiograma e avaliação do cardiologista infantil. B) Persistência de padrão fetal de circulação pulmonar, internação e uso de vasodilatador.
- b) A diferença não é significativa e o recém-nascido pode ter alta sem necessidade de investigação.
- c) Presença de cardiopatia congênita crítica, internação e realização de ecocardiograma.
- d) Presença de cardiopatia congênita sem repercussão hemodinâmica, dar alta com encaminhamento ambulatorial para seguimento e investigação.

46. Criança de cinco anos de idade está em pós-operatório de exérese de tumor de sistema nervoso central e apresenta poliúria acentuada. Os primeiros resultados de exames revelam sódio sérico de 165 mEq/L e urina tipo I com densidade urinária de 1005. A medida imediata mais adequada nesse caso é:

- a) Hidratar e iniciar desmopressina.
- b) Expandir com soro a 0,45% e colóide.
- c) Expandir em uma hora com soro glicosado ou água destilada.
- d) Iniciar restrição hídrica.
- e) Iniciar dexametasona.

47. Adolescente de 12 anos, sexo masculino, sem outras comorbidades, apresenta queixa de dor no joelho direito há dois meses sem trauma. Há uma semana começou a apresentar aumento de volume na região do joelho, sem história de febre. Ao exame observa-se discreto aumento de volume, sem sinais flogísticos. Na

radiografia do joelho observa-se lesão na região metafisária distal do fêmur, de limites imprecisos, com reação periosteal lamelar fina tipo raios de sol com presença de triângulo de Codman. A principal hipótese diagnóstica é:

- a) Osteossarcoma.
- b) Sarcoma de Ewing.
- c) Osteomielite.
- d) Osteoma Osteoide.
- e) Condrossarcoma.

48. Recém-nascido de 14 dias apresenta icterícia persistente desde o nascimento. Com relação a este caso, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Pela “Campanha do Alerta Amarelo” ele deve ser avaliado com urgência quanto à hipótese de colestase neonatal.
- b) O Ministério da Saúde do Brasil incluiu a “Escala Colorimétrica Fecal” na caderneta de saúde da criança, visando agilizar o diagnóstico e tratamento das hepatites neonatais.
- c) Na atresia biliar as enzimas hepáticas canaliculares estão mais elevadas que as tissulares.
- d) A ultrassonografia abdominal apresenta elevada acurácia para o diagnóstico de atresia biliar.
- e) A cirurgia de Kasai apresenta melhores resultados quando realizada até os 60 dias de vida.

49. Recém-nascido apresenta hipotonia, epicanto, fenda palpebral oblíqua, prega simiesca, clinodactilia do 5o dedo da mão, afastamento entre o 1o e o 2o dedos do pé e frouxidão ligamentar. O cariótipo mostra o seguinte resultado: 47 XY +21. Podemos afirmar que:

- a) É um caso de trissomia do cromossomo 21, causada por translocação herdada de um dos pais.
- b) A cardiopatia congênita mais comum nessa síndrome é a Tetralogia de Fallot.
- c) Deverão ser evitados, futuramente nesse paciente, movimentos de flexão total da coluna cervical realizados em cambalhotas e

outros esportes.

- d) A hipotonia muscular apresentada nesse recém-nascido não é um achado comum nessa síndrome.
- e) A vacina da varicela está contraindicada devido à imunodeficiência presente nesta síndrome.

50. Adolescente portador de hemofilia A grave dá entrada no pronto-socorro com quadro de hemartrose volumosa de joelho esquerdo e muita dor. Dentre as medidas terapêuticas abaixo, assinale qual NÃO pode ser utilizada:

- a) Analgesia com ácido acetilsalicílico ou narcóticos. B) Administração de fator VIII.
- b) Uso de corticosteroide oral.
- c) Administração de fator VIIa recombinante.
- d) Repouso articular e imobilização temporária.

RASCUNHO